


# ЛЕВОФЛОКСАЦИН АУРОБІНДО

Левовфлоксацин 500 мг/100 мл

ЯКЩО ЗВИЧАЙНИХ ЗАСОБІВ  
НЕДОСТАТНЬО...





# СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЛЕВОФЛОКСАЦИН АУРОБІНДО

**ЛЕВОФЛОКСАЦИН АУРОБІНДО.** 1 мл розчину містить левофлоксацину 5 мг.

## Показання.

- Пневмонія (госпітальна, негоспітальна, нозокоміальна)
- Гострий бактеріальний синусит
- Гострий бактеріальний рецидив хронічного бронхіту
- Ускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин
- Неускладнені інфекції шкіри та підшкірних тканин (включаючи абсцеси, флегмони, фурункули, імпетиго, піодермію, ранові інфекції)
- Хронічний бактеріальний простатит
- Ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідних шляхів
- Гострий пієлонефрит
- Легенева форма сибірської виразки (терапія/профілактика після експозиції)
- Чума

**Спосіб застосування та дози.** Левофлоксацин Ауробіндо показаний для лікування дорослих ( $\geq 18$  років) з інфекцією легкого, середнього та важкого ступеня, спричиною чутливими ізолятами шльових мікроорганізмів за умов, зазначених у цьому розділі. Левофлоксацин показаний, коли внутрішньовенний шлях введення забезпечує клінічну користь для пацієнта.

Тип інфекції	Введення дози кожні 24 години	Тривалість лікування (днів) <sup>1</sup>
Нозокоміальна (госпітальна) пневмонія	750 мг	7-14
Негоспітальні пневмонії <sup>2</sup>	500 мг	7-14
Негоспітальні пневмонії <sup>3</sup>	750 мг	5
Гострий бактеріальний синусит	750 мг 500 мг	5 7-14
Гострий бактеріальний рецидив хронічного бронхіту	500 мг	7
Ускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин	750 мг	7-14
Неускладнені інфекції шкіри і м'яких тканин	500 мг	7-10
Хронічний бактеріальний простатит	500 мг	28
Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, включаючи пієлонефрит <sup>4</sup>	750 мг	5
Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів, включаючи пієлонефрит <sup>5</sup>	250 мг	10
Неускладнені інфекції сечовивідних шляхів	250 мг	3
Легенева форма сибірської виразки (після експозиції), дорослі <sup>6,7</sup>	500 мг	60 <sup>7</sup>
Чума, дорослі <sup>8</sup>	500 мг	10-14

**Протипоказання.** Левофлоксацин Ауробіндо протипоказаний пацієнтам з відомою гіперчутливістю до левофлоксацину або до інших антибактеріальних препаратів групи хінолонів.

## Інструкція з використання Левофлоксацину Ауробіндо в одноразових контейнерах

1. Відкрийте зовнішню упаковку і дістаньте контейнер (первинну упаковку) з розчином.
2. Перевірте контейнер на можливі незначні витікання, обережно і міцно стиснувши. При виявленні витікання або якщо упаковка/закупорка не є неушкодженою слід вибракувати дану упаковку з розчином, оскільки стерильність лікарського засобу може бути порушена.
3. Не використовуйте препарат, якщо розчин є каламутним або в розчині наявний осад.
4. Використовуйте стерильну інфузійну систему, обладнання і витратні матеріали.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте контейнери у разі кількох послідовних з'єднань. Таке використання може призвести до повітряної емболії через залишкове повітря, що може потрапити з первинного контейнера до інфузійної рідини із вторинного контейнера.

## Підготовка до введення (інфузійна система-крапельниця):

1. Закрийте потік в інфузійній системі затискачем.
2. Зніміть кришку (ковпачок) з порту в нижній частині контейнера.
3. Введіть голку для препарату в інфузійний порт обертаючи голку доти, доки голка не буде щільно прилягати.
4. Розмістіть контейнер на штативі для інфузійних розчинів.
5. Затисніть і відпустіть камеру крапельниці, щоб встановити належний рівень рідини в камері крапельниці під час інфузії левофлоксацину.
6. Відкрийте затискач управління потоком, щоб видалити повітря з системи. Закрийте затискач.
7. Регулюйте швидкість інфузії шляхом управління потоком за допомогою затискача.

**Діти.** У зв'язку з можливістю ураження суголового хряща лікарський засіб не застосовують дітям (віком до 18 років).

**Умови зберігання.** Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Не заморозувати. **Упаковка.** По 100 мл розчину в контейнері, по 1 контейнеру в пакеті. **Виробник.** Ауробіндо Фарма Лімітед - ЮНІТ ІV, Індія / Aurobindo Pharma Limited - UNIT IV, India.



За детальнішою інформацією звертайтеся до Представництва «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні: 02095, м. Київ, вул. Срібнокольська 3Б, офіс 99 тел.: +38 044 5757730, факс: +38 044 5758309 e-mail: auroinfoukr@gmail.com www.aurobindo.com.ua



**AUROBINDO**  
Committed to healthier life!